

Uzsākta meža dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu



PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka 26.augustā ir uzsākta meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcīnu izvietošana, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, uzsākta Vidzemes reģionā – no Cēsīm un turpināsies līdz pat septembra beigām, izvietojo vakcīnas visā Latvijas teritorijā. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka 26.augustā ir uzsākta meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcīnu izvietošana, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, uzsākta Vidzemes reģionā – no Cēsīm un turpināsies līdz pat septembra beigām, izvietojo vakcīnas visā Latvijas teritorijā.

Meža dzīvnieku vakcinācijai tiek izmantota novājināta trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu saturoša vakcīna „Lusvulpen”, kas iestrādāta zivju miltu, tauku un parafīna maisījuma iekšpusē. Vakcīnas tiks izvietotas vienmērīgi – 20 līdz 23 vakcīnas uz 1 km².

Uzmanību - PVD aicina iedzīvotājus, kuri pamanījuši vakcīnu - brūnganu kubiņu, nedaudz mazāku par sērkokociņu kastīti, to neaiztikt, jo meža dzīvnieki sajūtīs cilvēku smaržu un ēsmu neēdīs. Īpaši jāpieskata bērni un mājdzīvnieki. Tā kā vakcīnas tiek kaisītas no gaisa, nav izslēgts, ka tās nokrīt arī apdzīvotu vietu tuvumā, kur var

piesaistīt bērnu un savā vaļā palaistu dzīvnieku – suņu un kaķu interesi.

Lai gan vakcīna nav bīstama ne cilvēkam, ne mājdzīvniekam, ne apkārtējai videi, tā ir paredzēta lietošanai tikai meža dzīvniekiem, tāpēc vakcīnu nedrīkst aiztikt. Ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu (ēsmas iekšpusē tā ir šķidra) – tā nonākusi acīs vai brūcē, jāvēršas pie ārsta. Vakcīna nav bīstama mājdzīvniekiem, tomēr, ja ir aizdomas, ka suns vai kaķis ir „pagaršojis” vai apēdis vakcīnu un viņa pašsajūta ir pasliktinājies, noteikti jāvēršas pie veterinārārsta.

Jāatgādina, ka trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku veselību un dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Trakumsērgas rezervuārs dabā ir savvaļas dzīvnieki, galvenokārt - lapsas un jenotsuņi. Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir savlaicīga un regulāra dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu.

2013. gada pirmajā pusgadā, līdzīgi kā pēdējos trīs gadus, pateicoties regulārajām lapsu un jenotsuņu vakcinācijas kampaņām pret trakumsērgu, Latvijā nav konstatēts neviens savvaļas dzīvnieku saslimšanas gadījums ar šo bīstamo infekcijas slimību.

Informāciju sagatavoja:

Pārtikas un veterinārais dienests